

PREMALİNG LEZYONLAR

- | Aktinik keratoz:En sık görülenidir
- | Lökoplaki
- | Bowen hastalığı
- | Queyrat eritroplazisi
- | Memenin Paget hastalığı

DERİ CA

MALİGN MELANOM

- | En sık süperficial M.melanom görülür
- | En iyi prognoz lentigo malign melanom dadır.
- | En kötü prognoz noduler M.melanomdadır
- | El içi-ayak tabanında Akral lentiginöz M.melanom siktır

- | Evrelemede Clark/breslow evrelemesi kullanılır
- | **CLARK EVRELEMESİ**
- | 1-Epidermis içinde
- | 2-papiller dermise ulaşmış
- | 3-papiller dermisi doldurmuş
- | 4-retiküler dermiste
- | 5-subcutan dokuya invaze olmuş

Bazal Cell Ca

- | Metastaz yapmaz kabul edilir
- | Rodent ülser buradadır

KAPOSİ SARKOMU

- | HIV+ lerde en sık malign tümör(lenfoma ile)
- | HSV-8 etken
- | En sık medial malleolden başlar
- | Mor-menekşe rengi lezyonlar+

BEHÇET

- | Oral aft(yolda 3 ten fazla)(En sık lezyon)
- | Genital ülser
- | Üveit
- | Eritema nodozum-tromboflebit-paterji testi
- | Tedavide ilk kolşisin!!!
- | Göz tutulumunda ilk seçenek steroid

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ÜROLOJİ

Konjenital Anomaliler

- Agenezis: Bilateral, oligohidroamnioz, AC hipoplazisi, tipik yüz (potter: hipertelorizm, epikantus, düşük kulak, basık burun)
- Hipoplazi: Küçük böbrek, sayıca az kaliks (5 ten küçük)
- Displazi: İmmatür kıkırdak, kistler içerir.
- At nalı böbrek: En sık füzyon anomalisidir. En sık alt uçta görülür.
- Posterior üretral valv: YD da en sık obstrüktif üretral lezyondur.
- Üretetopelvik darlık: Üreterin en sık konjenital anomalisidir. Çocukluk çağında hidronefrozun en sık nedenidir.

POLİKİSTİK BÖBREK

- En sık ağrı ile gelir.
- Hematüri+
- En sık komplikasyonu pyelonefrittir
- Erişkin tipte berry anevrizması+
- Kalikslerde yaylanma –itilme+(IVP de)
- Erişkin tip OD
- İnfantil tip OR
